

Las etapas del ordeño

- Todas las personas responsables del ordeño deben trabajar siempre de la misma manera siguiendo en orden las etapas recomendadas.
- Antes de comenzar, lave y desinfecte bien sus manos y utilice guantes limpios.
- Desinfecte los guantes regularmente durante el ordeño y evite contaminarlos.
- Mantenga un entorno limpio y sin estrés para los animales.



Etapa 1.

Observaciones

Asegúrese de identificar las vacas que deben ser ordeñadas en último lugar o que están bajo tratamiento (p. ej. aquellas marcadas con brazaletes en la pata).

Orden de ordeño sugerido para reducir el riesgo de propagación de bacterias causantes de la mastitis:

1. Las vacas sanas
2. Las vacas con un estatus de salud dudoso (adquiridas recientemente, recién paridas, en post-tratamiento).
3. Las vacas aquejadas de mastitis crónica
4. Las vacas que tengan una infección causada por un agente patógeno contagioso.



Etapa 2.

Primeros chorros (despunte)

Esta etapa es esencial para detectar los primeros signos de mastitis. Sirve para eliminar las bacterias del canal y para estimular la bajada de la leche. En estabulación fija, utilizar un jarro de pruebas para detectar más fácilmente los grumos, filamentos y la apariencia acuosa de la leche. El jarro de pruebas debe lavarse y desinfectarse después de cada ordeño. En la sala de ordeño se puede tirar la leche al suelo, pero nunca sobre las manos, ya que eso favorece la contaminación. El despunte debe hacerse en todos los cuartos. Si la leche tiene aspecto anormal, proceda al examen por palpación de los cuartos y pezones con el fin de detectar precozmente los signos de mastitis (enrojecimiento y calor) y otras lesiones.



Etapa 3.

Limpieza de pezones

Utilice un desinfectante aprobado por Santé Canada (Health Canada) y ajuste el tiempo de limpieza en función del nivel de suciedad. La desinfección mediante remojo implica que el producto debe permanecer en contacto con los pezones durante 30 segundos. Solo los pezones deben ser mojados y después secados individualmente a fondo con una servilleta seca. Preste especial atención al extremo del pezón. Pueden utilizarse también toallas impregnadas de alcohol.

Las etapas del ordeño



Etapa 4.

Colocación de las pezoneras

Se deben colocar entre 60 y 90 segundos (2 minutos como máximo) después del comienzo de la estimulación, es decir, la etapa 2: despunte. Este tiempo de espera beneficia el reflejo de la bajada de la leche y maximiza el rendimiento durante el ordeño.



Etapa 7.

Retirada de la unidad de ordeño

Si la retirada de las pezoneras es manual, cierre siempre el vacío antes de desenganchar la unidad de ordeño. Si la retirada es automática, controle que su funcionamiento sea correcto.



Etapa 5.

Posición de las pezoneras

Observe la ordeñadora conectada a la ubre y corrija rápidamente una posición demasiado alta sobre el pezón o una pezonera que se haya resbalado.



Etapa 8.

Desinfección

Después del ordeño, sumerja completamente el pezón en un desinfectante aprobado por Santé Canada (Health Canada). Los recipientes utilizados para este fin deben estar limpios. Deseche la solución restante, limpie el recipiente cuidadosamente y utilice una nueva solución en cada ordeño.



Etapa 6.

El fin del ordeño

El ordeño completo puede durar entre 5 y 10 minutos por vaca. Observe bien la salida de la leche o utilice indicadores de flujo para determinar el momento ideal para terminar el ordeño. Evite el sobreordeño.

