


Método de administración de tratamiento intramamario en ganado bovino lechero

Recomendaciones:

- 1- Utilice solamente productos aprobados para su administración intramamaria.
- 2- Asegúrese de que el entorno está limpio y de que el animal está bajo sujeción, si es necesario.
- 3- Prepare todo el material necesario: solución desinfectante de pezones, guantes, toallas limpias, algodones impregnados de alcohol, tubos para muestras, tubos de antibiótico.
- 4- Proceda con precaución para no introducir agentes patógenos en el pezón y para no dañar el canal interior del mismo.
- 5- Identifique el animal tratado. Evite toda contaminación de la máquina de ordeño o de la leche con el antibiótico.



Marque el animal y escriba su número de identificación y el tipo de tratamiento en los registros.



Utilice guantes desechables o, al menos, desinfecte bien sus manos antes de proceder.



Vacíe completamente los cuartos.




Sumerja el pezón completamente en un desinfectante aprobado por *Santé Canada* (*Health Canada*). Permita que el producto haga efecto durante 30 segundos y, a continuación, seque el pezón.

Método de administración de tratamiento intramamario en ganado bovino lechero



Desinfectar el extremo de cada pezón con un algodón limpio impregnado de alcohol. Repita la operación, si es necesario, hasta que el algodón salga limpio.



Desinfecte los pezones en el orden indicado: en último lugar desinfecte el pezón más cercano a usted para evitar la contaminación con el puño o la manga.



Para un tratamiento en periodo de lactación, tome previamente una muestra de leche antes del ordeño y del tratamiento, en caso de que sea necesario realizar un análisis.



Asegúrese de que la cánula del tubo no toque nada antes de ser introducida. Utilice la punta provista con una cánula corta para no dañar la queratina del canal.



Trate primero el pezón más cercano a usted, luego, los otros según el orden indicado.



Introduzca lentamente la preparación antibiótica en el cuarto. Asegúrese de vaciar completamente el tubo y de masajear la base del cuarto hacia arriba para distribuir el antibiótico.



Sumerja todo el pezón en una solución desinfectante de pezones.



Método de inserción parcial (3 mm)

La inserción parcial de una cánula larga evita que ésta empuje la queratina contaminada por bacterias del exterior del pezón hacia la cisterna de la ubre. Evitan también la dilatación del esfínter.

TRUCO : si la cánula es larga, pellízquela con los dedos a 3 mm de su extremo antes de insertarla.

