

5.1

Questionnaire abrégé Évaluation de la résistance de la vache

Ce questionnaire permet de faire une évaluation rapide de la résistance de la vache pendant la période de transition.

Date :

Producteur :

Vétérinaire :

Clinique :

L'alimentation



L'état corporel au tarissement

L'état corporel moyen lors du vêlage est supérieur à 3,5.

☐

Oui

☐

Non

Explication : Un état corporel excessif au cours du tarissement augmente le risque de stéatose hépatique et d'acétonémie.

La perte de poids excessive juste avant et/ou après le vêlage

La perte d'état corporel entre la fin du tarissement (période de transition) et six semaines après le vêlage est (en moyenne) > 1 .

☐

Oui

☐

Non

Explication : La perte excessive d'état corporel indique un bilan énergétique négatif excessif.

Les minéraux et les vitamines

Un apport de minéraux et de vitamines est donné à toutes les vaches tarées et les taures.


☐

Oui

☐

Non

Explication : Les vaches tarées et les taures sont souvent négligées pour ce qui a trait aux apports de minéraux et de vitamines en provenance de la ration.



Le stress

Lisez les énoncés suivants et si vous pouvez observer cette situation dans votre troupeau, indiquez le nombre de points attribué à ce facteur de risque. Faites ensuite le total.

Questionnaire Changements autour du vêlage		
Observations	Points	Pointage
1. Les vaches vêlent dans une stalle séparée des autres vaches (sans contact visuel ou auditif avec d'autres animaux).	oui = 4 points non = 0 point	
2. Les taures de 1 ^{re} lactation n'ont pas été familiarisées avant le vêlage à l'environnement qu'elles occuperont après le vêlage (leur stalle ou un nouveau type de stabulation).	oui = 6 points non = 0 point	
3. À la fin du tarissement et/ou le jour du vêlage, le fourrage servi contient une proportion inférieure à 50 % du fourrage qui sera donné au début de la lactation.	oui = 2 points non = 0 point	
4. À la fin du tarissement, la vache n'est pas habituée à au moins 2 kg de concentrés.	oui = 2 points non = 0 point	
5. Le veau n'est pas enlevé immédiatement (dans les six heures après la naissance).	oui = 2 points non = 0 point	
6. Il y a un surpeuplement dans le groupe de transition, c'est-à-dire, plus de vaches que de logettes. On vise 10 – 15 % de logettes excédentaires au cours de cette période.	oui = 6 points non = 0 point	
7. L'espace à la mangeoire est insuffisant pour le nombre de têtes dans le groupe de transition. Stabulation libre : On vise plus de 75 cm (30 po) par vache.	oui = 4 points non = 0 point	
8. L'accès à l'eau est insuffisant. Stabulation entravée : Si la distance est < 61 cm (24 po) entre le dessus de l'abreuvoir et tout obstacle pouvant se trouver au-dessus (ex. : Tuyau d'attache) ou si le débit d'eau est insuffisant. Stabulation libre : Si la longueur d'auge est < 60 cm (24 po) par 20 vaches ou s'il y a moins de 2 sites d'abreuvement par groupe de vaches (auges ou abreuvoirs individuels).	oui = 2 points non = 0 point	
Pointage total		
ATTENTION : Risque de stress si le pointage total est supérieur à 6 points.		

L'interprétation du résultat obtenu

Plus le total de points cumulés est élevé, plus le niveau de stress est lui aussi élevé. Généralement, il existe un lien entre le stress et l'affaiblissement du niveau de résistance de l'animal.

Les autres facteurs

Y a-t-il une incidence élevée de certaines maladies infectieuses (ex. : Bovine Viral Diarrhea (BVD)) ou de maladies liées à l'élevage (ex. : Des boiteries)?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, il est important de savoir que les maladies infectieuses et les maladies liées à l'élevage peuvent affaiblir la résistance.

Conclusion

En tenant compte des réponses aux différentes questions ci-dessus ainsi que du pointage obtenu au questionnaire sur le stress, nous sommes en mesure de déterminer si :

☐ Oui, il faut faire une évaluation approfondie de la résistance des vaches, à l'aide du questionnaire détaillée *Évaluation de la résistance de la vache*.

Ou

☐ Non, il n'y a pas lieu de faire une évaluation approfondie de la résistance.